

Ueber
Spontane Herzruptur.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
gesamnten Medicin,
verfasst und einer
Hohen medicinischen Fakultät
der
kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von
Richard Vetter,
appr. Arzt aus Waldkirch.

München.

Druck von M. Ernst, Senefelderstrasse 4.

1898.

Ueber
Spontane Herzruptur.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
gesamnten Medicin,
verfasst und einer
Hohen medicinischen Fakultät
der
kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von
Richard Vetter,
appr. Arzt aus Waldkirch.



München.

Druck von M. Ernst, Senefelderstrasse 4.

1898.

Referent :

Herr Obermedicinalrat Prof. Dr. **Bollinger.**

Meinen Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Der Entdecker des Kreislaufes William Harvey (1578—1657) erwähnte als erster die spontane Herzruptur. Seither wurde des öfteren von den Autoren ihrer gedacht. So berichtet bereits Morgagni¹⁾, der übrigens selbst an Cardiorrhexis starb, ausführlich über die spontanen Zerreißungen des Herzmuskels und spricht schon die Meinung aus, dass dieselben nur bei krankem Muskel vorkommen können. Besonders von französischer Seite wurden im letzten Jahrhundert viele Beiträge zur Casuistik und Aetiologie der Herzrupturen geliefert; zu erwähnen sind: Morand und Portal; bald darauf erschien eine grössere Abhandlung von Murray (De ruptura cordis dissert. Upsala. 1788). Unter den älteren Autoren herrschte die Ansicht, dass auch ein normaler Herzmuskel zerreißen könne, welcher Standpunkt wieder einen Vertreter fand in De zeeimeris²⁾ (1799—1852); er führt 3 Fälle von Herzruptur an mit der ausdrücklichen Angabe: „Herzmuskel vollkommen normal“; auch der Engländer Andrew erwähnt in seiner Statistik von 29 Herzrupturen 4 Fälle, wo das Myocard ganz normal gewesen sein soll, ebenso erwähnt Rostan 4 Fälle von Herzerreißung an angeblich gesunden Herzen. Es folgen noch Arbeiten über dieses Thema von Blaud und Rochoux. Besonders statistische Beiträge lieferten Ollivier, Pigeaux, Bertherand, Elleaume.

¹⁾ De sedibus et causis morbor. Neap. 1762.

²⁾ Arch. génér. de méd. Octob. 1834.

Dann waren es vor allem Rokitansky, Böttger und Quain, die diesbezügliche grössere Abhandlungen lieferten mit besonderer Rücksicht auf das aetiologische Moment. Sie nahmen die fettige Degeneration des Herzmuskels als Hauptursache für die Zerreissung an, welcher Darstellung sich auch Förster und die meisten Kliniker bis zum Ende der 70er Jahre anschlossen. Barth war der Erste, der die Abhängigkeit der Erweichungsherde im Herzmuskel von der Insufficienz der Ernährungsgefässe constatirt und die Vermutung ausspricht, dass, wenn man stets die Kranzgefässe am Sectionstische mituntersuchte, man in diesen in der überwiegend grossen Mehrzahl der Fälle die letzte Ursache der Herzruptur finden würde.“

Nach Leyden nahm man damals allgemein als Folge von Sklerose der Kranzgefässe Fettherz an, und so war also auch jetzt noch als nächste Ursache der Ruptur die diffuse fettige Degeneration des Herzmuskels angesehen. Doch kamen Fälle von Ruptur vor, wo wohl Sklerose der Kranzarterien, aber keine allgemeine Fettdegeneration des Herzens zu beobachten war; für solche Fälle musste man dann lokale Erkrankung annehmen. In neuerer Zeit haben sich grosse Verdienste in dieser Frage Weigert, Ziegler und Huber erworben, die durch ihre genauen mikroskopischen Untersuchungen mehr Licht brachten in die pathologisch histologischen Processe, welche zumeist die Veranlassung zur Herzruptur werden.

Im Folgenden soll ein Fall von Herzruptur mitgeteilt werden, der mir durch die Güte des Herrn Obermedicinalrat Dr. Bollinger zur Verfügung ge-

stellt wurde. Es handelt sich um eine 70 Jahre alte Frau, welche am 7. November 1897 ins hiesige allgemeine Krankenhaus verbracht wurde mit der Angabe, dass dieselbe plötzlich auf der Strasse unter starken Convulsionen bewusstlos zu Boden gestürzt sei. Die Angehörigen der Patientin teilten mit, dass dieselbe bereits früher an Kopfweh, Schwindelgefühl und leichten Ohnmachtsfällen gelitten habe; Patientin habe nie grosse Mengen Alcohol zu sich genommen.

Der objective Befund bei der Krankenhausaufnahme war folgender: Gesichtshaut stark livide verfärbt; die rechte Nasolabialfalte verstrichen; der rechte Mundwinkel abwärts hängend. Die Zunge wird beim Herausstrecken nach rechts verzogen, die Stellung der Augen ist normal. Herzbefund: der Spitzenstoss ausserhalb der Mammillarlinie fühlbar und hebenden Charakters. Das Herz nach rechts nicht verbreitert, die Töne rein. Puls frequent und gespannt.

Thorax: über der rechten Spitze verschärftes Atmen, verlängertes Expirium. Ueber den vorderen Lungenpartien hört man bronchitische Geräusche.

Die Extremitäten können mit Willen gut bewegt werden, rechts jedoch weniger wie links.

Die 2 nächsten Tage war das Befinden der Patientin ein gutes. Am 10. November abends bekam Patientin einen neuen apoplektischen Insult, dem sie in kürzester Zeit erlag.

Die Section*) hatte folgendes Ergebnis: Mittelmässige weibliche Leiche, blass, ohne Oedem, keine

*) Sections-Journal Nr. 991. 1897.

Totenflecke, beide Corneae getrübt. Thorax breit; Abdomen etwas vorgewölbt; reichliches Fettpolster. Musculatur blass, fettglänzend. Zwerchfellstand rechts IV links V R. Im kleinen Becken $\frac{1}{8}$ l. seröse Flüssigkeit. Wurmfortsatz mit Coecum adhaerent. Rippenknorpel etwas verknöchert.

Im Herzbeutel reichlich geronnenes Blut ($\frac{1}{4}$ l.) und fast ebensoviel dunkles flüssiges.

Die linke Lunge allseitig mässig fest verwachsen, die rechte im Bereich des Oberlappens adhaerent, sonst frei. In der Pleurahöhle ein Weinglas voll seröser Flüssigkeit. Das Herz ist mittellgross mit reichlich epicardialen Fette. Die Oberfläche ist überall mit geronnenem und flüssigem Blute bedeckt. An der linken Kante zeigt sich eine haselnussgrosse etwas abgeflachte Hervorsackung, welche von netzigem und körnigem Fibrin bedeckt ist und aus welcher sich auf Druck etwas flüssiges Blut entleeren lässt. Beim Sondiren kommt man auf eine für einen Bleistift durchgängige, zackige Oeffnung, welche aber fast vollkommen zusammengefallen ist. An dieser Stelle ist die Herzwand erheblich verdünnt. Von innen heraus erkennt man eine Ausbuchtung, die auseinandergezogen einen Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ cm aufweist.

Die Klappen der Aorta sind leicht verdickt. Die Musculatur des linken Herzens ist blass, schlaff, gering entwickelt. Auf Durchschnitten zeigt die Herzmusculatur überall gleichmässige Beschaffenheit, nirgends myocarditische Herde. Der Arcus Aortae ist nicht erweitert. Die Höhe des linken Ventrikels beträgt 8,5 cm; die Dicke 1,0 cm. Die Höhe des rechten Ventrikels beträgt 9 cm; die Dicke 0,3 cm.

Aortenumfang 7,5 cm; Pulmonalumfang 7,0 cm; Tricuspidalumfang 15 cm.

Die Lungen sind mit einigen bindegewebigen Auflagerungen auf der Pleura versehen, haben vermehrte Consistenz, sind mässig pigmentirt. An der Spitze beiderseits Schwielen der Pleura. Auf dem Durchschnitt das Lungengewebe netzförmig, bindegewebig verdickt; jedoch keine käsigen Knoten. Schnittfläche der Oberlappen annähernd bluthaltig, saftig; die der Unterlappen etwas dunkler. In den Bronchien etwas blutiger Schleim; in den Gefässen nichts besonderes; Bronchialschleimhaut etwas gerötet.

Leber mässig gross, von etwas vermehrter Consistenz mit leicht zugeschärften, jedoch ziemlich glatten Rändern; ebenso Oberfläche glatt. Schnittfläche mit verwaschener Zeichnung der Acini, Blutgehalt gering, Fettgehalt mässig. In der Gallenblase finden sich 2 über haselnussgrosse und eine Anzahl kleinerer, eckiger, teilweise abgeplatteter, linsenförmiger Gallensteine.

Die Milz gross, prall, mit verdickter Kapsel. Die Schnittfläche cyanotisch mit weicher, jedoch nicht vorquellender Pulpa. Follikel verwaschen; bindegewebiges Gerüst nur leicht vermehrt.

Die rechte Niere von mittlerer Grösse, die Kapsel nicht adhaerent; Venenstämme wenig gefüllt. Auf der Schnittfläche Rinde ebenfalls cyanotisch mit deutlicher Zeichnung an den Markteilen; Grenzzone dunkel gestreift. Nierenbecken erweitert. L. Niere wie die rechte. Consistenz beider Nieren etwas vermehrt.

Im Magen- und Darmkanal keine pathologischen Veränderungen.

Gehirn: Schädeldach dick sklerosirt, Diploë geschwunden; Dura verdickt, glatt. Die Gefässe der Hirnbasis in geringer Ausdehnung fleckig verdickt; die grossen Hemisphaeren mit mässigem Saftgehalt. Die Ventrikel enthalten wenig Inhalt. Rinde von graugelber Farbe.

Diagnose: Ruptura cordis. Chron. partielles Herzanemysma. Atrophie der Herzmuskulatur an der Rupturstelle. Arteriosklerose. Stauungsnieren.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
1. Dezeimeris, Arch. génér. Oct. 1834.	60 m.	An der hinteren Partie des linken Ventrikels eine 2 querfingerbreite Ruptur.	Herz nur etwas hypertro- phisch, sonst normal.	
2. Derselbe, ibid.	68 m.	Der linke Ventrikel der Länge nach zerrissen.	Herzmuskulatur und Ge- fäße normal.	
3. Derselbe, ibid.		An der Basis, nachdem Ursprung der Aorta ein für den kleinen Finger durchgängiges Loch.	Herzmuskulatur und Ge- fäße normal.	
4. Rokitsansky, Lehr- buch d. spec. path. Anat. 1844.	9 m.	Am obersten Teile des Septums gleich un- ter den Aortaklappen ein erbsengrosses, geris- senes Loch, das zu einem durch Aufwühlung d. Herz- fleisches entstandenen, in der Scheidewand der Vor- höfe lagernden, nussgrossen Sacke führt, der nach	Linker Ventrikel sehr er- weitert u. hypertrophirt; Endocard besonders am Septum sehr verdickt.	

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cardis an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
5. Köberle, Cannstatt Jahresh. 1854. II, p. 74.	71 w.	dem rechten Vorhofe hereinragt und in seinem hinteren Umfange hanfkorngross geborsten ist. Ruptur des linken Ventrikels: Längs des Septum links ein verticaler Riss von 3 cm, entsprechend dem mittleren Drittel der vordern Fläche, die Ränder unregelmässig zerrissen, die innere Öffnung weiter als die äussere. Herzfleisch brüchig.	Im Herzbeutel Serum und ein grosses Blutgerinnsel. Linkes Herz mässig erweitert. Die linke Kranzarterie läuft gerade über die Rupturstelle fort. Von innen setzt sich in die letztere eine bräunliche, ekrümliche Masse, offenbar ein in der Entfärbung begriffener Thrombus fort. Einige Athetromflecke in den Art. iliaca. Massiges Lungenemphysem. Herzfleisch brüchig.	Vor 6—8 Monaten an einer unbestimmten intercurrenten Affektion behandelt, seitdem zeitweise Anfälle von Suffocation und Orthopnoe; erst 8 bis 10 Tage vor dem Tode stehender Schmerz in Herzgegend, sowie Herzklopfen. Zuletzt fühlte sie, während sie sich ankleidete, einen heftigen Schmerz in der linken Seite; darauf Angst, Blässe, Synkope, kalter Schweiß; Tod in 4 bis 5 Minuten.

6. Hauska, Cannst.
Jahrb. 1855. III.
202.

31
m.

Durchbruch des Septum
ventriculorum cordis in-
folge von Endocarditis.

Das Ostium arteriosum si-
nistrum war sowohl gegen
den rechten als linken
Ventrikel gerichtet, und
gegen die Mitte des Lu-
mens der Aorta erhob
sich der wulstige, stark
von vorn nach hinten aus-
geschweifte, mit getrü-
btem verdicktem Endo-
cardium überzogene Rand
des Septum ventriculorum.

7. Peacock, Cannst.
Jahrb. 1855. III.
203.

62
m.

Im Septum ventriculo-
rum, etwa ein Drittel von
der Spitze des linken Ven-
trikels entfernt, ein grosser
Riss, der hinter der In-
section der Mitralklappe
begann, durch das Sep-
tum hindurchging und in
den rechten Ventrikel an
dessen Spitze mit einer
zerissenen Oeffnung ein-
mündete, eine Oeffnung,

Haemopericard. Beträcht-
liche Fettablagerung längs
des Verlaufes der Kranz-
gefässe. Linker Ventrikel
sehr vergrössert, seine
Wandungen dicker. Die
Klappen des linken Her-
zens stark verdickt, die
Kranzarterien athe-
romatös und verknö-
chert, das Aortastium er-
heblich verengt.

Im Allgemeinen immer ge-
sund, fühlte etwa 5 Tage
vor seinem Tode eine
leichte Schmerzhaftigkeit
in der Brust, welche Be-
schwerden nach ein paar
Tagen wieder verschwan-
den. Einige Tage später
auf eine rasche Körper-
bewegung nach reich-
licher Mahlzeit Beschlei-
mung der Respiration,

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht, Gewicht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
8. Chrastina, Ztschr. der Wiener Aerzte. C. J. 1857. 203.	54 w.	welche gross genug war, um die Spitze des Zeige- fingers hineinzu legen. Herz- substanz in der Umgebung des Risses stark fettig.	Herz klein und schlaff. Die Kranzarterien mit gelblich weissen Ver- dickungen besetzt.	etwa eine halbe Stunde später Tod.
		3—4" langer von oben nach unten verlaufender Riss an der Spitze des linken Ventrikels ge- gen die Scheidewand zu; dasselbst kleine aneury- smatische Ausbuchtung mit sehr dünner Wan- dung.		Herabgekommenes Weib, an Lungenemphysem lei- dend, stirbt plötzlich.
9. Derselbe ibid.	71 m.	An der vorderen Fläche des linken Ventrikels ein thalergrosser dunkel- brauner Fleck und an dessen oberer Begrenzung	Das linke Herz stark hyper- trophisch.	Gut genährter Mann, stirbt nach 3 Tagen unter Schwin- del, Beklemmung in der Praecordialgegend und sonstigen Zeichen eines

Blutverlustes schnell ohne
Todeskampf.

	eine ganz feine, das Herz- fleisch schief und ge- wunden durchbohrende Spalte. Das Muskelfleisch an dieser Stelle zer- bröckelt; fettige De- generation der Muskel- fasern.		
Ohne wesentliche Pro- drome von Schmerz in den unteren Extremitäten und minutenlanger Angst ergriffen, worauf Verlust des Bewusstseins, weder Radialpulse zu fühlen, noch Herztöne zu hören. Tod nach 1½ Stunden.		Ruptur an der hinteren Wand des linken Ventrikels; die äussere Öffnung etwas grösser als die innere. Erweich- ung und leichte Ver- dünnung der sonst hy- pertrophischen Ventrikel- wände an dieser Stelle; fettige Degene- ration ebenda.	10. Gernier, Bull. de la Soc. anat. 1857. C. J. 1857. III. 203.
Bis 2 Tage vor seinem Tode ganz wohl und auch an diesem nur leichtes Un- wohlsein. Plötzlich unter	Herzfleisch sehr weich und fettig aussehend. Athe- romatose der Kranz- arterien.	2 Zoll langer Riss an der vorderen Herzhälfte längs der Richtung des Septums.	11. O'Ferral, British med. Journ. Nr. 35. C. J. 1857.

Autor, Literaturangabe.	Altes, Ge- schlecht	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
12. Gouzy, Monit. des höp. Nr. 148, 149. 1857. C. J. 1858.	56 w.	Ungefähr in der Mitte des rechten Ventrikels ein dunkelroter Kreis von 3 cm, um diesen ein zweiter hellerer. Vom Cen- trum dieser beiden Kreise gehen 2—3 unregel- mässige Risse aus, die bis in die Höhle des Her- zens penetriren.	Pericard durch eine grosse Quantität Blut ausge- dehnt; Herz voluminös, abgeplattet. Chroni- sche Carditis.	Epileptische Frau; nach vorausgegangenem hef- tigem Schmerz in der epigastrischen Gegend plötzlicher Tod.
13. Buys, Journ. de Méd. de Bruxelles. C. J. 1859. III, 234.	76 m.	Gegen die Mitte des lin- ken Ventrikels und an der Vorderfläche ein Riss, 2—2½ cm lang, unregelmässig ausgezackt an den ecchymotischen	Haemopericard. — Herz selbst fettig. Leber cirrhotisch.	Früher gesund; nach einer Pause von einigen Tagen Besserung tritt wieder ein Anfall von Oppression, starkem Schmerz in Prae- cordialgegend auf! Mor-

14. Hamilton, The Lancet. 1860. C. J. 1860. III. 166.	63 m.	Rändern und einer Ul- ceration ähnlich.	Im linken Ventrikel, nahe der Spitze eine ganz kleine Oeffnung, welche mehr einer einfachen Tren- nung der Muskelfasern gleichet und nur durch eine leichte Ecchymose mar- kirt ist.	Pericard sehr beträchtlich ausgedehnt und ganz mit Blutgerinnseln gefüllt. In der Aorta atheroma- töse Stellen. Die Ven- trikelmündungen sonst ge- sund, nirgends Erweichung oder fettige Entartung.	gens plötzlich Tod ge- rade als Patient ausgehen wollte. Bis auf die letzten 2 Tage gesund, plötzlich von einer Unbehaglichkeit und Op- pression der Brust, Kälte der Extremitäten und Schauergefühl befallen. Während er ein kleines Packetchen über die Strasse trug, fiel er be- wusstlos um und starb nach wenigen Minuten unter leichten Convul- sionserscheinungen.
15. Malmsten, The Lancet. 1860. C. J. 1860. III. 66.	63 m.	Im linken Ventrikel, nahe der Spitze und $\frac{3}{4}$ " vom Septum entfernt ein $1\frac{1}{2}$ " langer mit Blut- gerinnseln ausgefüllter Riss, durch die äussere Muskelschicht des Her-	Art. coronar. sin. ge- schlängelt, die Wand teils verdünnt, teils verdickt; im Ramus anterior ein weisser Thrombus einige Linien von der degenerirten Stelle	Ganz gesunder, kräftiger Mann, glaubte sich am 13. Sept. 1859 erkältet zu haben; in der Nacht bekam er Schmerzen unter dem Sternum, der sich periodisch verschlim-	

Autor, Literaturangabe.	Alleg. Gef. schlecht	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
16. Neuffer, Württemb. Corresp. Blatt. 1861. C. J. 1861. III. 200.	65 m.	zens und das Pericard gehend. Die Umgebung des Risses in weiche, pulpöse Masse ver- wandelt, beginnende Ent- artung der Muskelfasern.	entfernt, das Lunen voll- ständig verschliessend.	merte, ohne Fieber; am 14. und 15. Stat. idem, nur jetzt Schmerz unter der linken Brustwarze; am 19. Zustand so gut, dass Pat. ausgeht, wo- durch wieder Verschlim- merung; am 20. vermehrte Schmerzen, kleiner fre- quenter Puls, schwaches Herzgeräusch und matte Herztöne, grosse Angst. Plötzlich Erstickungsan- fälle, Cyanose des Ge- sichts, Tod.
			Herzbeutel enthält ca. $\frac{1}{2}$ Schoppen Blutcoagula. Herz an der Oberfläche mit einer 3—5'' dicken Fettschichte bedeckt; die	Während der Jugend eine akute Brustkrankheit über- standen, litt seit längerer Zeit an einem Magen- katarrh, wurde nach einer

17. Arlidge, Beale's Arch. of Med. 1861. C. J. 1861. III. 199.	66 m.	krümmt verlaufender Biss, dessen äussere Umgebung etwas hyperämisch.	Dicke des linken Ven- trikels etwas vermehrt, Wandung brüchig, Aor- taklappen insuffi- cient, infiltrirt.	heftigen Gemütsbewegung tot aufgefunden.
		An der vorderen Fläche des linken Ventrikels 1 Zoll über der Spitze eine irreguläre Fissur 1 Zoll lang, die Ränder unregel- mässig, das umgebende Gewebe pulpös, dunkel- gefärbt, weich, mit schwarzen gummiösen Massen untermischt.	Haemopericard. Vorhöfe und Basis des Herzens von einer beträchtlichen Menge festen Fettes um- geben. Das ganze Herz kleiner, die Muskulatur dünner und weicher als normal. Die Kranzarterien kalkig verändert, ebenso die Aorta. Leber fettig, die Art. pan- creat. kalkig degenerirt.	Gut gebauter Mensch von guter Gesundheit, litt seit einem vor 10 Jahren über- standenen biliösen Fieber öfters an Schmerzen in der Brust und an dys- peptischen Erscheinungen. Am letzten Tage seines Lebens wurde er von all- gemeinem Unbehagen und einem Schmerz, haupt- sächlich im linken Hy- pochondrium, befallen; Magen ausgedehnt, Brech- neigung; Puls 80, schwach, regulär. In der Nacht Un- ruhe, vermehrte Brust- schmerzen, Atem er-

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
18. Lowe, Lancet. 1862. C. J. 1862. III. 174.	65 m.	An der Basis des rech- ten Ventrikels im Muskelfleische des Her- zens 2 Risse, von denen einer gezackt und $\frac{1}{4}$ Zoll lang, der andere ganz nahe dem ersten viel kleiner.	Haemopericard. Die Wan- dungen beider Ventrikel etwas weniger dick als ge- wöhnlich, sonst nirgends eine wesentliche Verän- derung bemerkbar.	schwert. Morgens beim Stuhlgange Tod. Kerngesunder, kräftiger Ar- beiter von nüchternen Lebensweise, erwacht plötzlich nachts wegen heftigen Schmerzen in der rechten Seite und stirbt bald darauf.
19. Soulier, Gaz. méd de Paris. 1863. C. J. 1863. III. 190.	82 w.	In einer von mehreren Ecchymosen ein 1 cm langer, schief nach unten und rechts verlaufender Riss im mittleren Drittel der hinteren Wand des linken Ventrikels, 1 cm neben dem Septum. Leichte aneurismati- sche Ausbuchtung und	Pericard mit Blut gefüllt. Herz etwas voluminöser als gewöhnlich, zeigt ausser einem gewissen Grad von Fettdegenera- tion gelbliche, un- regelmässig abgerundete Flecken, 2—3 cm im Durchmesser, hauptsäch- lich an der hinteren Partie	Immer gesund, nur zeit- weise an Bronchialkatarrh leidend. Eines Tages plötz- liche Bewusstlosigkeit, nach 10 Minuten wieder zu sich gekommen, ver- liert sie abermals nach einigen Minuten das Be- wusstsein, was sich inner- halb 1 Stunde 3—4 mal

20. Müller zu Calw, Württ. Corresp. Bl. 1864. C. J. 1864. III. 217.	62 w.	Verdünnung der Muscu- latur an dieser Stelle. Die innere Oeffnung un- regelmässig und wie zer- setzt, die äussere gerad- linig. Die Umgebung ist brüchig und zeigt fet- tiges Aussehen.	des linken Ventrikels. Die Mitralis ist verdickt, das entsprechende Ostium leicht stenosirt. Die Kranzarterien sind rigid, atheromatös; Aorta ebenfalls atheroma- tös; Leber brüchig; Lun- gen emphysematös.	wiederholte; dabei eine auffallende Blässe fort- während bestehend. Am nächsten Tage völliges Wohlbefinden, Herzdiam- pfung geringer als normal, Herzchoc energisch, Herz- töne dumpf, unregel- mässig. Puls 72, unregel- mässig. Am 5. Tage fiel sie beim Essen lautlos um und war in 5-6 Mi- nuten eine Leiche.
21. Cochetoux, Gaz. de hôpit. 1864. C. J. 1864. III. 217.	alt m.	In der Wandung des rech- ten Atriums ein $\frac{3}{4}$ " langer Riss. Die Substanz dasselbsterweicht, dünn und brüchig. 25 mm langer Riss an der Herzspitze und zwar mehr am linken Ventrikel. In der Umgebung die Herz- musculatur erweicht.	Haemopericard. Rechtes Atrium stark erweitert. Das ganze Herz schlaff. Die Ränder der Mitral- klappe etwas verdickt, Aorta leicht atheromatös. Grosses Haemopericard. An allen Orificien kalk- artige Concretionen.	Während des Lebens hän- fige Klagen über „Herz- weh“. Tod sehr plötzlich.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
22. Larcher, Union med. C. J. 1864. III. 218.	71 m.	An der vorderen Fläche, der Ventrikellaxe parallel, eine 1 cm lange Oeffnung mit zerfetzten Rändern; dadurch gelangt man durch einen fistulösen Gang in die linke Herz- kammer. Die Umgebung ist brüchig.	Haemopericard. Die Herz- musculatur ist schlaff. Atheromatose der Aorta.	Seit einiger Zeit an Brust- beklemmung in der Nacht, Schwindel am Morgen beim Erwachen und an hartnäckiger Verstopfung leidend, ausserdem grosses Durstgefühl. Eines Abends furchtbare Dyspnoe, Herz- choc stürmisch, unregel- mässig, grosse Unruhe. Obere und untere Ex- tremitäten oedematös. Nach einer Stunde Schlaf neue dyspnoische Anfälle, dann wieder Ruhe und Schlaf, Morgens tot auf- gefunden.
23. Spiegelberg, Virch. Hirsch Jrsb. 1866.	m.	Ruptur des linken Ven- trikels infolge akuter Myocarditis und par-		Vorher gesund, keine Symptome von seiten des Herzens. Plötzlicher

	tiellen Herzaneu- rysmas.		Tod am 3. Tage des Puerperiums.
24. Yarrow, Virch. Hirsch Jb. 1867.	34 m.	An der Spitze des linken Ventrikels eine kleine Rupturstelle.	Seit mehreren Monaten Dyspnoe, Husten und Be- engung in der Herzgegend. Herztöne schwach, sonst normal; Aussehen bleich. 4 Monate später bei star- ker Anstrengung durch Anziehen eines engen Stiefels fiel er plötzlich nieder, Cyanose, grosse Atemnot, nach 2 Stunden Tod.
25. Tachard, Virch. Hirsch Jhrb. II. 1867.	72 m.	1 cm über der Spitze des linken Ventrikels nahe dem Septum ein unregelmässiger von einem Gerinnsel verstopf- ter Riss. Auf der Höhe des Einrisses ist die Ven- trikelwand in eine Art rötlichen Breies	Nach einer überstandenen Spitzenpneumonie mit Bronchitis plötzlicher Tod, nach vorausgegangenen mehrmaligen Erbrechen. Ausser Mattigkeit und etwas benommener In- telligenz keine Symptome.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Ge- schlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
		verwandelt. Die innere Wand des apoplektischen Herdess besteht nur aus Bindegewebe; gestreifte Muskelelemente vollstän- dig verschwunden.	nulus fibrosus aortae, der Aortenbogen, die Arte- riae coronariae sind der Sitz atheromatöser Degeneration.	
26. Turel, V. H. J. 1867.	56 m.	Auf der hinteren Fläche des linken Ventri- kels ein 2 1/2 cm langer Längsriss. Auf der inneren hinteren Fläche des linken Ventrikels, in der Mitte seiner Höhe, nahe dem Septum eine von oben nach unten verlaufende 3 cm lange Oeffnung, welche mit dem äusseren Riss durch eine so reine Wunde communicirt, als wäre sie mit einem schnei-	Haemopericard. Mässige Vergrösserung des Her- zens. Im rechten Ven- trikel Spuren einer frischen Endocarditis. Die Wände des linken Ventrikels mindestens bis zur Stärke eines Centimeters ver- dickt. Leicht vermehrte Weichheit der Musculatur.	Während eines flüssigen Stuhlganges Befallenwer- den von 2 kurzen Ohn- machten. Eine Stunde nachher heftiger Schmerz in den Prae- cordien und dem Epi- gastrium mit Erstick- ungsgefühl. Grosse Schwäche. Weder Pal- pitationen, noch Kopf- schmerz, noch Brechneig- ung. Sprache langsam und schwach. Puls schwach,

		denden Instrumente gemacht: sie verläuft von vorn nach hinten und ein wenig von links nach rechts. Diese Wunde ist etwa $1\frac{1}{2}$ cm lang, und es zeigt der Teil der Ventrikelwand, welchen sie durchsetzt, keinerlei specifische Alteration.	regelmässig, etwa 80 Schläge. Herztöne normal, schwach, Extremitäten kalt. Wieder einige Erleichterung, doch 2 Stunden später plötzlicher Tod.
27. Shattuck, V. H. J. II. 1867.		5 Linien langer Riss an der Vorderfläche des rechten Ventrikels, nahe dem Septum.	
28. Moxon, V. H. J. II. 1867.		$\frac{3}{4}$ Zoll langer Riss in der vorderen Wand des linken Ventrikels, nahe dem Septum.	Die linke Kranzarterie atheromatös und verkalkt.
29. Ramskill, V. H. J. II. 1867.	45 w.	$\frac{1}{4}$ Zoll langer Riss an der vorderen Wand des linken Ventrikels, nahe dem Septum, etwa in	Fettherz.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Ge- schlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
30. Lewis, V. H. J. II. 1867.		der Mitte zwischen Spitze und Basis.	Fettherz.	
31. Spencer Smith, V. H. J. II. 1867.		Transversaler Riss von 1 Zoll Länge auf der Vor- derfläche des linken Ventrikels nahe der Spitze. Nicht völlig penetrirende Wunde des rechten Herzens.	Akute Pericarditis.	
32. Liouville, V. H. J. II. 1868.	83 w.	Unvollkommene Ruptur der vorderen Wand des rechten Ventrikels, unvollständige, bis unter das Epicard reichende an der Spitze.	Bedeutendes Haemoperi- cardium. Die Herzmus- culatur in grosser Aus- dehnung verfettet. Be- deutende Sklerose und Verfettung der Arterien- wandungen.	Kommt mit den Symp- tomen einer heftigen Bron- chitis in Behandlung. Plötzlich unregelmässige, schwache Herzaktion, Zu- nahme der Herz- dämpfung, Dyspnoe höchsten Grades, Kälte der Extremitäten, sub-

33. Buckingham, V. H. J. II. 1868.	67 m.	In der vorderen Wand des linken Ventrikels ein 2" langer Riss. An der entsprechenden Stelle auf der Innenfläche des Herzens eine Ausbuchtung.	Bedeutende Verdünnung der Wandungen des Cor; die Trabeculae carnaeae atrophisch.	Seit einer Woche heftige Angina pectoris; der Puls sehr verlangsamt, häufig bis 44, u. aussetzend. Am Herzen nur hin u. wieder deutliches bruit de „va et vient“ und Fehlen des ersten Tones. Zeitweilig beide Töne vollkommen rein.	normale Temperatur und einige Stunden später Tod.
34. Little, V. H. J. II. 1868.	65 m.	An der Spitze des linken Ventrikels auf der vorderen Fläche ein $\frac{1}{4}$ " langer Riss, der die ganze Herzwand durchsetzte, rechts neben demselben fand sich die Musculatur ebenfalls durchbrochen und das Blut bei erhaltenem Epicard in Gestalt einer grossen Echymose unter letzteres ergossen.	Haemopericardium.	Sehr korpulenter Mann. 12 Stunden vor dem Tode heftig. Oppressionsgefühl im Praecordium; im zweiten Anfälle Tod.	

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
35. Buhl, V. H. J. I. 1869.	64 w.	Riss an der Aussenseite des linken Ventrikels in der Mitte zwischen Basis und Spitze, von links hinten und oben nach rechts vorn und unten sich erstreckend. Die Länge betrug $1\frac{1}{2}$ cm. Die wenig klaffende Oeff- nung hatte fetzige Ränder und war durch eine persi- stirende Pericardium- brücke halbirt.	Haemopericardium. Cir- cumscripte trockene Peri- carditis mit hochgradiger Fettdegeneration der anliegenden Muskeln.	Schon längere Zeit Klagen über Herzklopfen und Re- spirationsbeschwerden. Bei einem Hustenanfall plötzlicher Tod.
*36. Lund und Heiberg, Norsk. Mag. for Laegev. V. H. J. 1870.	61 m.	Am linken Ventrikel nahe am Septum ein 2 Zoll langer, schräg durch das Herzfleisch gehender Riss.	Atherom der Coro- nararterien. Der zur Rissstelle gehende Ast ist thrombosirt.	Pat. erkrankte plötzlich mit Schmerz in der Brust u. Ohnmachtsgefühl. Puls klein und schwach. Später auch Schmerzen im linken Arm. Am anderen Tag ein ähnlicher Anfall mit

Dyspnoe verbunden. Plötzlicher Tod während des Schlafes in der folgenden Nacht.

Pat., der früher eine syphilitische Infection durchgemacht, klagte 8 Tage lang über Schmerz in der Herzgegend und Herzklopfen. Plötzlicher Tod.

Während 6 Tagen anallweises Auftreten von Attennoth, Schmerz in der linken Seite, kalten Schweissen. Dabei kleiner Puls. Lästiges Verschlucken. Tod plötzlich während des Trinkens, nachdem während der letzten Tage das subjective Befinden sich gebessert hatte.

Am rechten Ventrikel ein kegelförmiges Geschwür, dessen Spitze mit einem $1\frac{1}{2}$ Zoll langen Riss in den Herzbeutel perforirt war. Zerfallenes Gumm.

In der Mitte der hinteren Wand des linken Ventrikels ein querverlaufender, 1 Zoll langer Riss. Die Musculatur ist hier völlig fettig degenerirt.

49 w.

72 w.

*37. Gregorie, Memorab. V. H. J. 1870.

*38. de Bary, Deutsch. Arch. Bd. VII. 1870.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses, Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*39. Védie, Gaz. des Hôpit 1871. V. H. J. 1872.	m.	Ruptur des rechten Vorhofes „durch Mus- keldegeneration“.	Hypertrophie des linken Ventrikels, Stenose des Ostium aortae: Athe- rose der Hirn- arterien.	Geisteskranker. Plötz- licher Tod.
*40. Wiltshire, Transact. of Path. Soc. 1871. V. H. J. 1872.	52 w.	Ruptur des linken Ven- trikels nahe dem Sep- tum, 1 Zoll daneben noch eine unvollständige Ruptur.		Plötzlicher Tod.
*41 Hughes, Lancet. July. 1872.	36 m.	Ruptur des rechten Ventrikels entlang dem Septum, in der Mitte zwischen Spitze und Basis 1/2 „ lang, Umgebung weich, dünn.	Pericard bedeutend aus- gedehnt. Bedeutende Er- weichung des Herzens.	Die anscheinend gesunde Person war plötzlich im Schlafe gestorben.
*42 Westcott, Brit. Med. Journ. May. V. H. J. 1872	m.	Am unteren Teile des linken Ventrikels ein- innen 3/4 Zoll, aussen 1/4	Herzmuskel fettig de- generirt.	Tod nach mehrtägigem Un- wohlsein (Nausea, Magen- schmerzen u. Schwäche)

*43. Lowe, Lancet. Oct. V. H. J. 1872.	66 w.	Zoll langer Riss. Innen hier ein Papillarmuskel zerissen.	Herzwände abnorm dünn. Atherom der Aorta.	Die vorher gesunde Frau starb nachts plötzlich, nachdem sie vor 6½ Stun- den einen vorübergehen- den Anfall von Unwohl- sein und Erbrechen durch- gemacht hatte.
*44. Simon, Berl. klin. Wochen- schrift Nr. 45. 1872.	71 m.	Ein kleiner Querriss an der Spitze des linken Ventrikels, durch zwei feine Oeffnungen mit der Höhle des lin- ken Ventrikels communi- cirend.	Atherom der Kranz- arterien. Aortenklap- pen atheromatös. Hoch- gradige Fettdegenera- tion des Herzmuskels. Insuffizienz der Mitral- klappen.	Plötzlicher Collaps, Tod nach 2 Stunden.
*45. Laboulbène und Labarraque, Gaz. méd. de Paris Nr. 35. V. H. J. 1872.	71 w.	An der Spitze des linken Ventrikels ein 1½ cm langer, von rechts oben nach links unten verlauf- ender Riss, der einen ge- krümmten Kanal darstellt.	Musculatur fettig de- generirt. Coradiposum. Atherom der Kranz- gefäße. An einer an- deren Stelle ein weiss- liches Gewebe, die Narbe	Pat., die vor 1 Monat crou- pöse Pneumonie, dann Gesichtserysipel durchge- macht hatte, starb ganz plötzlich.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
46. May, Brit. Med. Journ. July. 1869. Schmidt's Jahrbücher. 1872.	61 m.	In der Nähe des Ventrikel- septums 2 kleine Oeff- nungen in der Vorderwand der linken Herzhälfte.	einer früheren, unvollständigen Ruptur. Starker Bluterguss im Herzbeutel. Herzmusculatur fettig degenerirt und blass. Vordere Wand des linken Ventrikels sehr dünn, aber inwendig mit Ablagerungen versehen. Aorta atheromatös.	Tod am 17. Tage nach dem Anfall. Herzdämpfung war vergrößert. Linke Seitenlage unmöglich. In den letzten zwei Tagen Anschwellen der Beine.
47. Watson, Med. Times and Gaz. July. 1867. Sch. Jahrbücher. 1872.	56 w.	Ruptur eines Aneurysmas an der Spitze des linken Ventrikels.	Bluterguss im Herzbeutel. Sehr reichlich subpericardiales Fett.	Früher ausser Bronchialkatarrh gesund. Vor drei Monaten zum ersten Male wegen Schmerzen in der Herzgegend in Behandlung. Allmähliches Nachlassen der Beschwerden; dann plötzlich Tod.

48. Thompson, Lanc. II. 1871. Sch. Jahrbücher. 1872.	56 m.	Ruptur im linken Ventrikel: an der Herzspitze eine kleine Rupturstelle von $\frac{1}{4}$ " Länge. Die Perforationsöffnung durch Fibrinlagen verstopft.	Herz fast ganz fettig degenerirt, sehr zerreisslich.	Stets gesund und thätig bis 24 Stunden, bevor er über Schmerzen klagte. Beim Versuche vom Bett aufzustehen, heftige Schmerzen, unter starker Zunahme derselben Tod.
*49. Hill, Brit. Med. Journ. V. H. J. 1873.	65 w.	Ruptur des rechten Ventrikels.	Herzmuskel fettig degenerirt.	
*50. Dandridge, Philad. Med. and Surg. Rep. XXVIII. V. H. J. 1873.	30 w.	Riss der Spitze des linken Ventrikels. Muskulatur hier „faserig indurirt.“	Herzmuskel fettig entartet.	Verf. nimmt konstitutionelle Syphilis an.
*51. Foulis, Glasgow Med. Journ. V. H. J. 1875.	47 m.	In der äusseren unteren Wand des linken Ventrikels ein $\frac{1}{2}$ Zoll langer Riss.	Muskulatur hypertrophisch und sehr reich. Atherom der Gefässe. Haemorrhagische Infarkte in den Nieren und im Grosshirn.	
52. Reeves, Schmidt's Jahrbüch. 1875. Bd. 165.	60 m.	Ruptur des rechten Ventrikels: unregelmässig gestaltete, kalkartige Ab-	Bluterguss im Herzbeutel; auf letzterem auch Kalkablagerungen. Die Portio	Bei kleinsten Anstrengungen heftige Schmerzen in der Herzgegend. Die Artii

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
		lagerung, grösser als ein Zweischillingstück, tief in die Substanz des rechten Ventrikels eindringend; neben dieser eine Fissur, in deren Umgebung die Musculatur sehr weich.	thoracica der Aorta kno- chenartig verhärtet.	radiales hart und unelas- tisch. Herztöne rein, aber schwach. Tod 36 Stunden nach einem ungewöhnlich starken Schmerzanfall.
53. Derselbe, ibidem.	55 m.	Im linken Ventrikel dicht am Septum eine wall- nussgrosse Ausbucht- ung; nahe an der Spitze dieser Tasche ein kleiner Riss, in welchen die Spitze eines Katheters No. 2 ein- führbar ist. Die Muscu- latur in der Umgebung sehr weich.	Haenopericard. Leber und Nieren vergrössert.	Seit einigen Wochen be- sonders bei Anstrengun- gen Schmerz in der Herz- gegend, selbst Ohnmachts- anfälle. Objektiver Befund negativ. Nach Stuhlgang plötzlich heftige Schmer- zen in Herzgegend, $\frac{1}{2}$ Stunde später Gesicht bleich, kalter Schweiss, Hand kalt, Puls kaum fühlbar, Herzdämpf- ung beträchtlich

54. Derselbe, ibidem.	70 m.	Auf der hinteren Seite des linken Ventrikels ein Riss, gross genug, um die Spitze des kleinen Fingers einzuführen.	Pericard enthält grosse Mengen coagulirtes Blut. Herzsubstanz sehr weich.	grösser als vorher Herztöne kaum zu hören; ung. nach 5 Stunden Tod.
55. Derselbe, ibidem.		Unmittelbar über den Aortaklappen ein kleiner aneurysmatischer Sack, an dessen Spitze eine kleine Oeffnung.	Pericard mit 1,5 Kilogr. theils flüssigen theils geronnenen Blutes gefüllt. Ein zweiter kleinerer, leerer Sack fand sich hinter dem ersten.	Beim Auskleiden plötzlich ein Schrei, unmittelbar darauf Tod. Früher nie Beschwerden in Herzgend.
*56. Tergami, Ann. univ. di med. Luglio. V. H. J. 1876.	60 m.	Kreisförmige Oeffnung im Septum interventriculare. In der Umgebung beginnende Fettdegeneration der Musculatur.	Herzdämpfung etwas vergrössert, Töne rein.	

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*57. Stevenson, Edinburg, Med. Journ. Sept. V. H. J. 1876.	65 m.	Mehrfache Ruptur der vorderen Herzwand nahe Spitze, zu beiden Sei- ten des Septum ven- triculorum. Die Mus- culatur hier in starker Degeneration.	Die Kranzarterien- äste in der Nähe der Risstellen sehr ver- engt.	Plötzlicher Tod.
58. Abbt, J. D., Erlangen 1875. Sch. Jahrbücher. J. D. von Aschenbrenner 1890.	76 w.	8" langer Riss an der vor- deren Fläche des linken Ventrikels, ein Zoll vom Septum entfernt.	Kranzgefäße ver- knöchert. Muskelge- webe gesund, nicht be- sonders erweicht.	
59. Derselbe, ibidem.	68 w.	Vordere Wand des linken Ventrikels parallel und nahe dem Septum ein 1" langer Riss.	Muskeifasern fettig de- generirt. Ein Zweig der Art. coron. durch kal- kige Ablagerungen beinahe geschlossen.	

60. Derselbe, ibidem.	66 m.	Ruptur an der Spitze des linken Ventrikels neben dem Septum.	Art. coron. sin. ram. ant. thrombosirt.
61. Derselbe, ibidem.	69 w.	Riss an der hinteren Wand des linken Ventrikels, 9" lang.	Art. coronar. atheromatös.
62. Derselbe, ibidem.	45 m.	Herzspitze wie von einer Schusswunde perforirt, entstanden durch Gangrän der Spitze.	Untere Partie der Arteria coronaria völlig verknöchert.
*63. Tenison, Brit. Med. Journ. April. V. H. J. 1879.	38 w.	Die Wand des rechten Vorhofes an zwei Stellen geborsten. Hier hochgradige Fettdegeneration der Muskelfasern.	Leichte Insufficienz der Mitralklappe.
64. Du Jardin-Beaumez, Bull. de Théor. X. CIII. 1877. Sch. Jahrb. 1879.	27 m.	Auf der vorderen Fläche des linken Ventrikels etwas oberhalb der Herzspitze ein 5 mm breiter, innen kaum zu bemerkender Riss.	Herzfleisch sehr brüchig und von gelblichem Aussehen. Tetanus. Am 9. Tage, als schon Besserung eingetreten war, beim Aufstehen plötzlich Tod.

Die korpulente Person, die ein sehr lockeres Leben führte, starb plötzlich während eines Brechversuches.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*65. Derselbe, ibidem.	75 m.	In der Wandung des linken Ventrikels auf der Aussenseite ein ca. 1 cm langer Riss, durch einen gewundenen Gang in die Höhe des linken Ventrikels führend.	Herzbeutel gespannt, enthält grosse Mengen geronnenen Blutes. Atheromatose der Basilargefäße des Gehirns.	Gastrische Störungen, allgemeine Mattigkeit; am 6. Tage Tod.
*66. Macleod, Lyon. Brit. Med. Journ. Dec. V. H. J. 1881.	58 m.	Ruptur des linken Ventrikels.	Chronische Myocarditis, Endocarditis; Atherom der Aorta.	Pat. starb plötzlich; er soll frühere Symptome einer Herzkrankheit gezeigt haben.
*67. Mollière, V. H. J. 1882.	54 w.	Ruptur des linken Ventrikels. Die Umgebung brüchig.	Myocarditis subacuta, mit stellenweiser Nekrose der Herzmusculatur. Thrombose eines Kranzarterienastes.	Plötzlicher, augenblicklicher Tod.
*68. Duffrey, Dubl. Journ. of Med. July. V. H. J. 1882.	65 m.	In der hinteren oberen Wand des rechten Vorhofes ein $\frac{3}{4}$ Zoll langer Riss.	Aortaklappen atheromatös verdickt.	Pat., der vorher stets gesund war, starb nach einständiger Dauer eines synkopalen Anfalles.

*69. Corley, Dubl. Journ. of Med. July. V. H. J. 1882.	70	In der hinteren Wand des linken Ventrikels ein 1¼ Zoll langer, bis zur Herzspitze verlaufender Riss.	Pat., der als unknässig ge- schildert wird, litt 2 Jahre lang an Angina pectoris und starb plötzlich.
*70. Potain, Gaz. des hôpit. V. H. J. 1882.	45	Zweifacher Durch- bruch eines intracar- dialen Aneurysmas, dem oberen Teile des rechten Ventrikels angehörend.	Erst seit 14 Tagen vor dem Tode Anfälle von Prae- cordialangst. Plötzlicher Exitus letalis.
*71. Duffey, Dubl. Journ. of Med. Science. V. H. J. 1872.	65	Weiter Riss in der hinteren oberen Wand des rech- ten Vorhofes.	Der vorher anscheinend gesunde Mann starb in einem Anfälle von Schwäche u. Praecordial- angst. Mehrere Stunden vorher hatte er einen ähnlichen Anfall gehabt.
*72. Coupland, Lancet. Dec. V. H. J. 1882.	65	Ein ½ Zoll langer Riss in der hinteren Wand des linken Ventrikels.	Tod 40 Stunden nach dem plötzlichen Eintreten von Symptomen eines Herz- leidens.

Autor, Literaturangabe.	Alter Ge- schlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*73. Klippel, Prog. med. V. H. J. 1882.	60 w.	Complete und vollständige Herzruptur, infolge von secundärer Erkrankung der Muskelfasern.	Thrombose in den Kranzgefäßen.	
*74. Klippel, ibidem.	77 w.	Herzruptur infolge secun- därer Erkrankung der Muskelfasern.	Thrombose der Kranz- arterien.	
*75 Steven, Glasg. Med. Journ. V. H. J. 1883.		Herzruptur durch Berst- ung eines Herzaneu- rysmas.		
*76. Derselbe, ibidem.		Herzruptur durch acute Nekrose des Myocards.	Chronische interstielle Myocarditis. Der zur Riss- stelle verlaufende Ast der Kranzarterie ist verstopft.	
*77. Derselbe, ibidem.		Zerreissung einer Herz- wand. Die Umgebung des Risses zeigt Nekrose des Myocards.	Die zur Rissstelle verlauf- ende Coronararterie ist undurchgängig.	

*78. Green, Lancet. V. H. J. 1884.	77 m.	Ruptur der hinteren Wand des linken Ventrikels	Derentsprechende Kranz- gefässast ist athrom- bosirt.	Der vorher scheinbar ge- sunde Mann morgens todt im Bette gefunden.
*79. Derselbe, ibidem.	66 m.	Ruptur des rechten Ventrikels.	Herzmusculatur gesund.	Plötzlicher Tod nach eini- gen tiefen Inspirationen.
*80. Mackenzie, Brit. Med. Journ. V. H. J. 1884.	75 m.	Ruptur des linken Ven- trikels. Hier sehr hoch- gradige Fettentartung des Muskels.	Musculatur diffus fettig degenerirt.	Pat. starb plötzlich beim Mittagessen, als er ein grösseres Stück Fleisch verschlucken wollte.
*81. Mickle, Edinb. Med. Journ. V. H. J. 1884.	66 m.	Unvollständige Ruptur des linken Ventrikels. Myocard hier sehr weich.	Musculatur des linken Ven- trikels fettig degenerirt.	Geisteskranker. Vor- her keine Symptome einer Herzaffection. Tod zwei Stunden nach Beginn der Initialsymptome.
*82. Derselbe, ibidem.	70 w.	Grosser Riss im linken Ventrikel.	Musculatur fettig dege- nerirt, am linken Herzen aber stärker als rechts.	Geisteskranker. Plötz- licher Tod. Vorher keine Symptome eines Herz- leidens.
*83. Derselbe, ibidem.	70 w.	Ruptur des rechten Ventrikels.	Herzmuskel fettig dege- nerirt.	Geisteskranker. Plötz- licher Tod. Bis dahin keine Symptome eines Herzleidens.

Autor, Literaturangabe.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*84. Tomkins, Brit. Med. Journ. May. V. H. J. 1885.	63 w. In der hinteren Wand des linken Ventrikels, in der Mitte zwischen Basis und Spitze, ein 1½ Zoll langer Riss. Hier bedeu- tende Fettentartung der Musculatur. In der Nähe des Risses ein zer- rissener Papillarmuskel.	Herzmuskel fettig entartet, linker Ventrikel hyper- trophisch. Atherom der Aortenklappen.	
85. Pochmann, Wiener med. Presse No. 43. V. H. J. 1886 II.	38 m. Berstung eines Herz- aneurysmas.	Haemopericard (500 g).	Tod während der Nacht- ruhe. Als Krankheits- ursache wird angegeben die anstrengende Arbeit (Feuerarbeiter) und die direkte Einwirkung des Feuers, die nach Ansicht des Verf. eine circum- scripte Entzündung des Herzens hervorgerufen habe.

86. v. Limbeck, Prag.med. Wochen- schr. V. H. J. 1886. II.	73	Ruptur eines Herz- aneurysmas an der Vorder- und Hinterwand des linken Ventrikels, Erweichung eines Theiles des Herzmuskels.	Myomalacia cordis. Ver- schliessung der Coro- nararterien linkerseits.	Bei der Defaecation plötz- licher Tod. Im Leben kein Zeichen von Herz- leiden.
87. Trier, Revue de méd. 1886. p. 81. Centr. bl. f. klin. Med.	64	Herzruptur infolge einer fettigen Degene- ration und Atrophie einer circumscripten Stelle an der vorderen Wand des linken Ven- trikels.	Mässige Haemopericard. Atheromatose des zuführenden Kranz- arterienzweiges, des- sen Lumen durch einen entfärbten Thrombus fast völlig verstopft ist.	Pat. (der Kopenhagener Physiologe Panum) litt in den letzten Jahren an einer chron. häufiger exa- cerbirenden Bronchitis, war etwas kurzatmig. Eines Abends fühlte er nach einem Spaziergange heftige Schmerzen in der Herzgegend; Erschei- nungen von Praecordial- angst und Angina pectoris stellten sich ein; Würgen und Brechneigung. Nach einigen Morphininjek- tionen Linderung für die Nacht, fühlte sich mor- gens besser, plötzlich

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
88. Goode Adams, The Lancet. V. H. J. 1887. II.	59 m.	Ruptur der vorderen Wand des linken Ventrikels.	Fettige Degeneration des Herzmuskels. Atherom der Aortenklappen, Ver- kalkung der Coronar- arterien.	stiess er einen schmerz- haften Schrei aus, wurde blau im Gesicht, verlor das Bewusstsein und starb nach wenigen Minuten. Die Ruptur erfolgte während der Defäcation, wonach Pat. sich noch ins Bett begeben konnte. Nach der Ansicht Verfs. (Goode Adams) das klin. Bild einer acuten idiopathi- schen Pericarditis.
89. Muir, Glasg. Journ. May. V. H. J. 1888. II.		An der Wand des rechten Vorhofs zwischen bei- den Vv. cavae fand sich ein grosser, 2 Finger einlass- ender Riss; die Wand des Vorhofes stellenweise bis zu Papierdicke verdünnt.	Haemopericard. Herzmus- kel ausserordentlich blass, fettig degenerirt. De- generationsflecke am Ar- cus Aortae.	Pat. wird im Bett bewusst- und pulslös angetroffen. Die Auscultation ergab äusserst schwache inter- mittirende Herzschräge. Kein Spitzenstoss. Ohren purpurn. Sehr schnelle

Atmung (50 in der Minute)
Nach Wiederkehr des
Bewusstseins auf exci-
tirende Mittel werden die
Herzschläge kräftiger und
regelmässiger; Klagen
über heftige Schmerzen
in Rücken und
Abdomen. Gesicht
cyanotisch, der übrige
Körper bleich. $\frac{3}{4}$ Stun-
den nach Beginn des An-
falles Tod.

90. Beck, J. D.
Tübingen, 1886.

60
w.

Die vordere Wand des
linken Ventrikels er-
scheint ausgebuchtet,
2 cm links vom Septum
ein 3 cm langer Riss, von
oben nach unten ver-
laufend.

Die Art. coron. sinist.
ist durch Arterioskle-
rose verengt, der Ast,
welcher zur Rupturstelle
geht, fast völlig verschlos-
sen. In dem anderen
Aste, der am Rande der
Ruptur und dem Septum
sich herabzieht, sitzt ein
das Lumen obturirender,

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
91. Derselbe, ibid.		Auf der Rückseite des linken Ventrikels 2 cm nach vorn vom Septum ein 3 cm langer, zackiger Riss.	trocken aussehender grau- rother Thrombus.	
92. Derselbe, ibid.	m.	Die Partien des linken Ventrikels über der Herzspitze erscheinen aneurysmatisch erweitert, dort befindet sich ein 3 cm langer zackiger Riss, am Septum beginnend und nach links und aussen verlaufend.	Die Coronararterien sind allgemein arterio- sklerotisch, der Ast, welcher zur Rupturstelle führt, ist derart verengt, dass man nur beigenaue Zusehen gerade noch ein feines Lumen erkennen kann.	Die Kranzgefäße sind leicht sklerotisch, der ram. descend. ist gleich von seinem Abgange an durch graurote Throm- busmassen total verengt.

93. Friberger, Upsala laek. förh. XII. Schmidts Jahrbücher 1887.	w.	Ruptur mit Zerrei- ung des Pericard: im oberen linken Theil des linken Ventrikels eine 35 mm lange und 15 mm breite Ruptur; ausserdem noch ein zwei- ter Riss gegen die Mitte zu.	Pericard stark von Blut- massen ausgedehnt, an seinen oberen Theile zwei Öffnungen. Musculatur des l. Ventrikels blass.	Stark kyphotische Fran.
94. v. Maschka, Vjrschr. f. ger. Med. N.F. XLVIII. Sch. J. 1888.	3 m.	4 cm langer Riss in der linken Herzhälfte.	Herz stark mit Fett be- wachsen, Myocard sehr blass und brüchig.	Von seiner Stiefmutter schlecht behandelt, eine Stunde lang im Zimmer allein gelassen, todt auf- gefunden. Der Zusammen- hang zwischen Verletz- ungen und Herzerreiss- ung war nicht zu con- statiren.
95. Neelsen, Festschrift, Leipzig 1888. Aschenbren- ner, München, 1890.	65 w.	An der Vorderwand des linken Ventrikels dicht neben dem Septum ein 1,5 cm im Durchmesser haltender Erweich-	Im linken Herzzohr ein das- selbe vollständig ausfüll- ender graurother Throm- bus. In dem am Septum verlaufenden Zweig des	36 Stunden vor dem Tode Hirnenbolie mit links- seitiger Lähmung. Plötz- licher Tod über Nacht.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
96. Derselbe, ibidem.	67 m.	ungsherd, in dessen Zentrum $\frac{1}{2}$ cm langer Riss.	ram. descend. der Art. coron. sin. ein obtu- rirender, mässig fest anhaftender Pfropf.	
		Ander Ventrikelspitze unmittelbar neben dem Septum, ist die Muskel- wandung des Herzens vollständig zerstört; es findet sich hier ein mit weicheeren, frischen Blut- gerinnseln ausgefüllter De- fect von unregelmässig zackiger Gestalt und ca. 4 cm Durchmesser, dessen Ränder zerfetzt, haemor- ragisch infiltrirt, dunkelbraunroth er- scheinen.	Die Coronararterien sind atheromatös, an der Abgangsstelle des ab- steigenden Astes der Art. coron. sin. sitzt ein wand- ständiger, alter, organi- sirter, nicht völlig obtu- rirender Thrombus. Die unteren Zweige dieses Astes, 4 cm unterhalb der Abgangsstelle durch obturende frische Thromben verlegt.	

97. Derselbe, ibid.

43	m.	An der vorderen Wand des linken Ventrikels, neben dem Septum, $\frac{1}{3}$ seiner Höhe, ist eine thalergrosse, weichere Stelle, dunkelroth gefärbt, im Centrum ein 2 cm langer Riss.	Die Kranzarterien sind stark verdickt, der absteigende Ast der Art. coron. sin. ist stark verengt, zeigt raube Innenfläche und das Lumen erscheint durch ein den Wänden anhaftendes blasse rothes Gerinnsel völlig verschlossen.	
98.	Derselbe, ibid.	alt w.	An der Vorderfläche des linken Ventrikels, 2 cm vom Septum entfernt ein 2 cm langer Riss, schief von rechts nach links verlaufend, demselben entsprechend im Herzfleisch ein 2 cm im Durchmesser haltender Erweichungsherd.	Die Coronararterien verengt, der absteigende Ast links stark verkalkt und durch mässig fest anhaftendes graurothes Gerinnsel verschlossen.
99.	Witke, Path. Transact. XII. V. H. J. 1890.	45 m.	In der Wand des linken Ventrikels $1\frac{1}{8}$ Zoll unterhalb der Atrioventricularis	Starker Bluterguss in das erweiterte Pericard. Aorta stark atheromatös.
100.	Witke, Path. Transact. XII. V. H. J. 1890.	45 m.	In der Wand des linken Ventrikels $1\frac{1}{8}$ Zoll unterhalb der Atrioventricularis	9 Monate lang wegen eines Aneurysmas beobachtet. Plötzlicher Tod.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
		tricularscheidewand und $\frac{5}{8}$ Zoll von der Intra- ventricularscheidewand eine kleine Ruptur, die einen Catheter No. 2 auf- nahm. Die eingeführte Sonde führte schräg auf- wärts, rückwärts und nach rechts durch einen engen Canal in den rechten Ven- trikel unmittelbar unter die Pulmonalklappen, durch stark degenerirte Herzmusculatur.	Der Conus arteriosus war nach der rechten Seite in ein grosses uniloculäres Aneurysma mit sehr dicken Wänden verwandelt. Das Aneurysma dehnte sich über das Lu- men der Pulmonalis hin- aus aus.	
100. Schilling, Zeitschr. für Medi- cinalb. V. H. J. 1890.	alt w.	Ruptur des Herzens am linken Ventrikel.	Herzmusculatur hoch- gradig schlaff, atrophisch, fettig entartet.	Von einem Wagen gestreift, fiel sie um und starb in 20 Minuten. Keine äusseren und inneren Verletzungen nachzuweisen.

101. Mackintosh, Lancet. Febr. V. H. J. 1890.	61 m.	Am oberen hinteren Theile des linken Vorhofs ein gerissenes, unregel- mässiges Loch für einen Finger Eintritt gestattend. Die Ränder dieses Loches sowie das umgebende Gewebe in einer Ausdeh- nung von $\frac{1}{4}$ Zoll nach jeder Richtung hin ecchy- mosirt.	Haemopericard. Bedeu- tende Herzdilatation, fet- tige Degeneration des Herzmuskels. Fettige Ent- artung der Leber.	Klagen über Schmerzen im Epigastrium nach vorheriger völliger Gesund- heit. Nachts plötzlich Tod ohne vorangegangene Be- schwerden während des Schlafes.
102. Squire, New-York Rec. 30. May. V. H. J. 1891.	73 m.	2 Rupturen an der vor- deren Wand des rechten Ventrikels.	Fettige Degeneration des rechten Ventrikels.	Vorher gesunder Mann, beim Stuhlgange plötz- licher Schmerz in der Herzgrube, welcher zu- nahm bis zum Tode.
103. de Grandmaison, Bull. de la Soc. anat. de Paris. 1890 Sch. Jahrbücher 1891.	m.	In der Vorderwand des linken Ventrikels ein $2\frac{1}{2}$ —3 cm langer Riss.	Pericarditis besonders des visceralen Blattes. Die linke Kranzarterie in ihrem Anfangstheile durch Atherom stark ver- engt. Fettdegeneration des Myocardium.	Tod unter stärkster Dyspnoe.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
104. Crocker, Lancet. 1890. Sch. J. 1891.	72 w.	Riss an der Rückseite des linken Ventrikels nahe dem Septum, 2 Zoll oberhalb der Herzspitze.	Herzfleisch fettig infiltrirt und degenerirt.	
105. Klein, Virch. Arch. Bd. 118. Centralblatt f. Path. und path. Anat. 1891.	32 w.	Ungefähr dreieckige Oeff- nung mit ca. 1 cm lan- gen Seiten zwischen der rechten und hinteren Aortaklappe. Aneurys- ma der Pars mem- bracea septi ventri- culorum cordis. Die Oeff- nung führte in einen halb- wallnussgrossen aneurys- matischen Sack, der sich in den rechten Vorhof vorwölbte und mit ihm durch unregelmässig be- grenzte Oeffnungen com- municirte.	Gleich über der Eingangs- öffnung begann und setzte sich auf die Aorta fort ein atheromatöser Process mit mässiger aneurysmatischer Aus- buchtung u. Verdünnung der Wand.	Tod unter den Erschei- nungen eines Klappen- fehlers.

106. Achalmé, Centralbl. f. Path. u. path. Anat. 1892	67 w.	Ruptur eines Herz- aneurysmas.	Sklerose der Coro- nararterien.	
107. Herb, Transact. of The Path. Soc. of Lon- don 1890. Sch. Jahrbücher 1892.	65 m.	An der Vorderseite des linken Ventrikels ca. 2,5 cm oberhalb der Herzspitze eine lineare Ruptur.	Pericard mit Blut gefüllt. Myocard blass, weich, frei von fettiger Degeneration; mikrosk. grosse Mengen von gelblichen Granula nachweisbar.	Bei raschem Laufen plötz- lich gestorben.
108. Coats, Glasg. Med. Journ. 1891. Sch. J. 1893.		Ruptur an der Spitze des linken Ventrikels infolge Infarktbildung	Thrombose des zufüh- renden Kranzarterien- astes.	
109. Buchanan, ibid.		Ruptur des linken Ven- trikels nahe am Septum in einem Herd von Coa- gulationsnekrose.	Thrombose des zugehör- igen Coronararterien- astes.	
110. Halipré, Centralbl. f. Path. u. path. Anat. 1893.		Ruptur eines Herzaneu- rysmas an der hinteren Wand des linken Ven- trikels.		
111. Cecil F. Beadles, Centralbl.	65 w.	Ruptur der vorderen unteren Wand des linken	Ausgedehnte subpericardiale Fettgewebsentwick.	Geisteskranke.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
f. Path. u. path. Anat. 1894.		Ventrikels, 1½ cm von der Herzspitze entfernt.	lung. Starke Verdünnung der Muskulatur und fett- ige Auflagerung. Sklero- tische Veränderungen an den Klappen.	
112. Derselbe, ibid.	54 m.	Ruptur des linken Ven- trikels wie im vorigen Falle.	Veränderungen wie im vorigen Falle.	Geisteskranker. (Ausz- serdem beschreibt Beades noch 4 weitere Herzrup- turen bei Geisteskranken).
113. Pitt, Transact. of. The path. Soc. of Lon- don 1891. Sch. J. 1895.	28 m.	Ruptur eines Herzaneu- rysmas des linken Ventrikels.	In der Wandung beider Herzhälften ausgedehnte gummöse Veränder- ungen. Sklerose der Aorta. Narbig entartete Hoden.	Während der antispyphili- schen Behandlung plötz- lich gestorben.
114. Fraser, Lancet. 1893. Sch. J. 1895.	43 m.	Zwei feine Kanäle durch die Wand des linken Ventrikels.	¾ l. Blut im Herzbeutel. Interstielle Entzündung, Pigmententartung des Myocard.	

115. Derselbe, *ibid.*

Haemopericard.

Durchbruch eines kleinen Aneurysmas des Sinus Valsalvae in den Herzbeutel.

116. Krönig, med. Wochenschr. 1895.

Herzruptur in Folge von Wandaneurysma. Dicke der Herzwand an der Rissstelle 2 mm.

Herzbeutel prall mit Blut gefüllt. Auf der vorderen Fläche der Wandung frische Pericarditis, auf der Innenfläche ein apfelgrosser Thrombus; auch an der verdünnten Herzspitze ein Thrombus. Im Herzmuskel zahlreiche Gummiknoten.

Pat. leidet seit ca. 8 Tagen an Anfällen von Athemnoth, die in den letzten Tagen sehr hochgradig war. Herztöne rein; Herzdämpfung nach links verbreitert; Puls 104, unregelmässig.

117. Vincent, Griffon, Centralbl. f. Path. u. path. Anat. 1895

71 Ruptur des linken Ventrikels an der hinteren Fläche nahe dem linken Rande zwischen unterem und mittlerem Drittel.

Makroskopisch keine Veränderungen des Herzmuskels, der Gefässe etc. wahrzunehmen.

Tod erfolgte nach einer starken psychischen Erregung.

118. D. W. Collings, Lancet. 1895. Centralbl. f. inn. Med.

53 3½ cm lange Ruptur der lateralen Wand des linken Ventrikels.

Haemopericard. Dilatation der Herzhöhlen. Vorgeschnittene fettige Degeneration des Myocards.

Mit hemiplegischen Symptomen ins Krankenhaus gebracht, starb Pat. plötzlich bei einer geringen Anstrengung.

Autor, Literaturangabe.	Alter, ge- schlechtl.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
119. Charon, Arch. de Neurolog. 1896. Sch. J. 1897.	74 w.	Ruptur des rechten Herzohres.	Aorta und ihre Verzwei- gungen atheromatös ver- ändert. Am Herzen sowie an einigen Gliedermuskeln starke Verfettung. Er- weichung der rech- ten Kleinhirnhem- isphäre, Athrophie des r. Peduncul. cerebelli, sowie der r. Hälfte der Med. obl. und des Hals- marks. Das ganze Ar- teriensystem überall sklerotisch.	Geisteskranke. Seit langer Zeit an Grössen- ideen und den verschie- densten psychischen Stör- ungen leidende Frau. Einige Tage Schwindel, Erbrechen; plötzlicher Tod.
120. Schwalbe, Centralbl. f. inn. Med. 1896. p. 89.	alt m.	Herzruptur.		Vor 30 Jahren Lues ac- quirirt und mässiger Wein- potator, bekam vor meh- reren Monaten eine ziem- lich profuse Haemoptoe;

das Herz war nach links verbreitert, systolisches Geräusche über der Aorta. Im weiteren Verlaufe Dämpfung über dem Manubrium sterni, zeitweise eine Differenz der Radialpulse und wiederholte kleinere Haemoptysen. Tod plötzlich.

Litt vorher an Kurzatmigkeit und geringen Husten. In den letzten 8 Tagen vor dem Tode stellten sich Anfälle von Schmerzen in der Herzgegend, die in den l. Arm ausstrahlten, und Praecordialangst ein. Nachdem in der letzten Nacht ein derartiger, sehr heftiger Anfall vorübergegangen war, wurde Pat. am Morgen auf dem Stuhle sitzend todt aufgefunden.

Herz stark vergrößert, bedeutende Aortenstenose.

4 cm langer Riss an der Spitze des linken Ventrikels. Myocard hier in starker Fettdegeneration.

62 m.

*121. Aus dem patholog. Institut zu München.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses, Veränderungen des Myocards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*122. Desgleichen.	59 m.	Incomplete Ruptur des linken Ventrikels, ausgehend von der Wand eines chron. Herzaneurysmas. Obstruierende Thrombose der Art. coron. Myocard hier in vorgeschrittener Fettdegeneration.	Beginnendes Haematom pericardium und umschriebene Pericarditis. Mässige Vergrößerung des Herzens.	Seit 2 1/2 Jahren Anfälle von Angina pectoris. Symptome von Herzschwäche ausserhalb der Anfälle. Rasch eintretender Tod während eines Anfalles von Angina pectoris.
*123. Desgleichen.	48 w.	Etwa 3 cm über der Spitze des linken Ventrikels ein 1,5 cm langer, durch eine Pericardialsperre halbierter Riss. Hier hochgradige Fettdegeneration des Herzfleisches.	Atherom der Herzklappen sowie der Coronargefässe. Circumscribte Pericarditis.	Die corpulente Frau litt längere Zeit an heftigen asthmatischen Anfällen, die meist Nachts auftraten. Tod plötzlich bei einem Hustenanfall.
*124. Desgleichen.	alt m.	Eine grössere und mehrere kleinere Risse stellen gegen die Spitze	Atherom der Aorta. Fettdegeneration des Myocards in verschiedenen	Kam wegen geringer Athemnoth ins Spital und starb plötzlich während der Nacht.

*125. Desgleichen.		des linken Ventri- kels zu.	Graden. Schrump- niere.
	47 m.	Am seitlichen Rande des linken Ventrikels ein 8 cm langer Riss, der durch einen geschlängel- ten, eine Strecke unter dem Pericard verlaufen- den Gang mit der Ven- trikelhöhle communicirte.	Schrumpfniere. Athe- rom der Gehirn- arterien.
*126. Desgleichen.	45 w.	An der Spitze des rech- ten Ventrikels ein durch Blutgerinnsel ver- stopfter Riss. Herzmuskel hier stark brüchig, ver- fettet.	Ein hühnereigrosser Throm- bus füllt den rechten Ven- trikel fast ganz aus. Leichter Grad von Schrumpfung der Nieren.
*127. Desgleichen.	68 m.	An der Spitze des rech- ten Ventrikels eine für eine Sonde durch- gängige Oeffnung. Mus- culatur hier sehr brüchig.	Herz hypertrophisch, Ven- trikel dilatirt. Cyanotische Induration beider Nieren.

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht, schlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
*128. Desgleichen.		Ein 1 cm langer Riss in der vorderen Wand des linken Ventrikels.	Herz hypertrophisch. Atherom der Kranz- gefässe. Der zur Riss- stelle ziehende Arterien- ast undurchgängig.	
*129. Desgleichen.		In der hinteren Wand des linken Ventrikels eine fistelgangähnliche Continuitätstrennung.		
130. Desgleichen.	91 m.	Auf der hinteren Fläche des linken Ventrikels nach der Spitze zu ein querverlaufender Riss, ca. 2 cm lang mit blutig in- filtrirten, unregelmässigen Rändern. In der Nähe des Risses einige Haemor- rhagien, durch das Epicard durchscheinende Herde	Herzbeutel mit Blut gefüllt. Die Wandung des linken Ventrikels gegen die Spitze hin auffallend dünn. Im l. Ventrikel eine grössere Anzahl von weisslich- grauen, wandständigen Thromben. Embolie der Arteria pro Fossa Silvii linkerseits. Die Coro-	Nach überstandener hef- tiger Influenza mit Bron- chitis bei einer Defäkation ein apoplektischer Anfall.

131. Desgleichen.	68 m.	von schmutzigbrauner Farbe. Die Musculatur in der Umgebung des Risses brüchiger. An der Vorderwand des Herzens eine in den linken Ventrikel führende ca. 3 cm lange Ruptur mit zerfetzten Rändern, auf der Höhe einer aneurysmatischen Ausbuchtung. Atrophie der Herzmusculatur an der Rupturstelle.	nararterien ver- dickt, verhärtet, im Ram. desc. der Art. coron. sin. 1 cm vom Ursprung entfernt ein weisslicher Thrombus das Lumen vollständig verschliessend. Herzbeutel prall mit Blut gefüllt. Herz mässig vergrössert. Ziemlich reichlich epicardiales Fett. Die Coronargefässe sklerosirt, besonders der Ram. desc. der Art. coron. sin. Das Lumen desselben gegen die Spitze hin fast nur für eine Stecknadel durchgängig. Geringe fettige Degeneration der Muskelfasern. Haemorrhagischer Infarkt der linken Lunge. Haematom der Dura mater, die	Geisteskranker erkrankte an Bronchitis, grosse Schwäche, täglich zunehmend. 10 Tage später traten Oedeme an den Extremitäten auf, vorübergehend auch an den Lidern; Füsse tief cyanotisch, kalt und anästhetisch. Nach weiteren 5 Tagen Exitus letalis unter den Zeichen höchster Herzschwäche.
--------------------------	--------------	--	--	--

Autor, Literaturangabe.	Alter, Geschlecht.	Sitz und Beschaffenheit des Risses. Veränderungen des Myo- cards an dieser Stelle.	Sonstige patholog. Befunde am Herzen und anderen Organen.	Klinische Notizen und allgemeine Bemerkungen.
132. Desgleichen.	70 w.	An der linken Kante eine haselnussgrosse, et- was abgeflachte Her- vorsackung, welche von netzigem u. körnigem Fibrin bedeckt ist. Auf der Höhe derselben eine für einen Bleistift durch- gängige, zackige Oeffnung. Atrophie der Herzmus- culatur an dieser Stelle.	Gefässe an der Gehirn- basis zeigen fleckige, atheromatöse Trüb- ung. Im Herzbeutel reichlich geronnenes und flüssiges Blut. Musculatur des linken Ventrikels blass, schlaff, gering entwickelt. Klappen der Aorta leicht verdickt. Atheromatöse Veränderungen an den Gehirnarterien. Stau- ungsniern.	Pat. stürzte plötzlich unter starken Convulsionen be- wusstlos zu Boden, er- holte sich wieder bis zum Abend und fühlte sich die nächsten 2 Tage wie- der wohl; am 4. Tage nochmals von einem sol- chen Anfall befallen starb sie plötzlich. Pat. soll früher öfter an Kopf- weh und Schwindel ge- litten haben. Der Herz- befund im Leben bot keinerlei Anhaltspunkte

Bevor ich auf die Aetiologie der Herzrupturen eingehe, sei es mir gestattet, einige zusammenfassende Bemerkungen aus obiger Tabelle zu machen.

Was die Häufigkeit der Herzruptur betrifft, so gibt Devergne an, dass auf 40 plötzliche Todesfälle einer durch Spontanzerreissung des Herzens komme. Nach Aran fanden sich unter 202 plötzlichen Todesfällen infolge von Veränderungen im Circulationsapparat 33 durch Herzruptur. Nach sämtlichen Statistiken kommt dieselbe beim männlichen Geschlechte häufiger vor, als beim weiblichen. Der Grund dafür hängt offenbar mit der grösseren Häufigkeit der atheromatösen Erkrankung bei Männern zusammen. Nach obiger Tabelle wurden 72 Männer und 42 Weiber betroffen.

Mit der Häufigkeit der Arteriosklerose steht wohl auch im Zusammenhange das überwiegende Vorkommen von Herzruptur im höheren Alter. Bei Elléaumes Fällen ist das Durchschnittsalter 65 Jahre. Nach obiger Tabelle vertheilt sich das Alter folgendermassen.

Von 1 bis 20 Jahren 3 Fälle

„ 20	„ 30	„ 2	„
„ 30	„ 40	„ 6	„
„ 40	„ 50	„ 11	„
„ 50	„ 60	„ 14	„
„ 60	„ 70	„ 44	„
„ 70	„ 80	„ 24	„
„ 80	„ 100	„ 3	„

Das Durchschnittsalter ist sonach das 60. Jahr.

Weitaus am meisten wird der linke Ventrikel und hier wieder die vordere Fläche und Spitze betroffen;

es verhalten sich diesbezüglich (nach ob. Tab.) die
vordere zur hinteren Fläche zur Spitze wie

6 : 3 : 4

Nach Elléaume fanden sich unter 55 Fällen

43 am linken Ventrikel

7 „ rechten „

3 „ rechten Vorhof

2 „ linken „

Nach Ollivier unter 47 Fällen:

34 am linken Ventrikel

8 „ rechten „

3 „ rechten Vorhof

2 „ linken „

Nach obiger Tabelle werden von 120 Fällen be-
troffen

Der linke Ventrikel 92 mal

„ rechte „ 15 „

„ rechte Vorhof 7 „

„ linke „ 1 „

das Septum 5 „

Die Grösse des Risses ist sehr variabel, je nach
der Ausdehnung der circumscripiten Texturveränderung
des Herzmuskels und je nach der Intensität eines
Hilfsmomentes. In der Mehrzahl der Fälle hat der
Riss eine Länge von 1 bis 3 cm; in manchen Fällen
(wo z. B. die Ruptur nur sehr allmählich zustande
kommt) ist die Rupturstelle kaum sichtbar oder stellt
eine kaum für eine feine Sonde zugängige Oeffnung
dar, andererseits — in seltenen Fällen — reicht der
Riss über die ganze Länge eines Ventrikels, ja selbst
quer über beide Ventrikel. Der Risskanal hat meist
einen gewundenen Verlauf und geht gewöhnlich von

oben nach unten in der Richtung der Längsfasern des Herzmuskels, wesshalb die äussere Oeffnung der inneren nicht entspricht; es kommt sogar vor, dass sich der Kanal in seinem Verlaufe durch den Herzmuskel teilt, und man constatirt so aussen 2 Mündungen, während innen nur eine einzige. Die äussere Rissöffnung ist vielfach grösser als die innere (wohl analog der Ein- und Ausschussöffnung eines Projektils, wenn man die Richtung der wirkenden Kraft bei Herzruptur von innen nach aussen annimmt); doch kommt auch der umgekehrte Fall vor. In der Mehrzahl der Fälle findet sich nur ein einziger Riss, doch sind 2 und auch mehrere Rupturen an einem Herzen keine abnorme Seltenheit (cf. Tab. 12, 44, 46, 57, 63, 70, 93, 102, 114. 124). Die äussere Rissöffnung hat meist unregelmässige, gezackte und zerfetzte Ränder; in der Umgebung ist die Herzmusculatur theils atrophisch, mürbe, theils weich, breiig.

Unter den 132 Fällen der Tabelle, soweit überhaupt Bemerkungen über Texturveränderungen und Aetiologie gemacht sind, werden in Zusammenhang gebracht mit fettiger Degeneration 40 Fälle, mit atheromatösen Veränderungen der Coronararterien 47, speciell mit Aneurysma des Herzens 23, mit Syphilis 5, mit Geisteskrankheit 8; eine Herzruptur erfolgte bei einer epileptischen Frau, eine bei einem Manne mit Tetanus. Vor allem möchte ich noch die 46 Fälle seit dem Jahre 1886 einer besonderen Berücksichtigung empfehlen, da man bei diesen eine genauere pathologisch-histologische Untersuchung voraussetzen darf, als es früher geschehen ist. Unter diesen 46 Fällen finden sich 10 mal Aneurysma des Herzens, 16 mal eine circumscrip-

Texturveränderung des Myocards, 20 mal atheromatöse Veränderungen der Coronargefässe als in direktem Zusammenhang mit der Ruptur stehend erwähnt. Sehr bemerkenswert dürfte auch erscheinen, dass unter den 12 im hiesigen pathologischen Institut verzeichneten Fällen von spontaner Herzruptur zugleich 4 mal Schrumpfnieren (cf. Tab. 124, 125, 126, 127) und eine Stauungsnieren (cf. Tab. 132) beobachtet wurden. Der enge Zusammenhang beider Prozesse ist sehr einleuchtend.

Hat die Ruptur stattgehabt, so ergiesst sich wohl je nach der Grösse und Gestalt des Risses eine grössere oder geringere Blutmenge in den Herzbeutel (falls derselbe nicht eng mit dem visceralen Blatte oblitirirt ist). Bei Eröffnung des Pericards findet man dann gewöhnlich neben einer Menge noch flüssigen Blutes ein Blutgerinnsel auf dem Herzen aufsitzend, nach dessen Entfernung man die Rupturstelle gewahrt wird.

Um nun zur Aetiologie der Herzrupturen zu kommen, will ich eine Reihe von selteneren Ursachen vorausschicken.

In ganz vereinzelt Fällen wurde beobachtet, dass eine Echinococcuscystie im Herzmuskel durch ihre excessive Vergrösserung zur Verdünnung und schliesslich zum Durchbruch der Wandung geführt hat. Auch Ulcerationen, die, vom Endocard oder Pericard ausgehend, in das Herzfleisch fortgeleitet werden, können diesen Effekt haben; Böttger erwähnt 3 derartige Fälle wo eine maligne ulceröse Endocarditis schliesslich zur Ruptur resp. Perforation führte. Dann beschreibt Elléaume 2 Fälle wo eine eitrige Myocarditis die Ursache einer Herzerreissung war. Auch Blutergüsse

aus geborstenen Herzgefässen können nach beiden Seiten hin sich Durchbruch verschaffen. Elléaume beobachtete einen solchen Fall, wo das Aneurysma einer Coronararterie sowohl nach der Ventrikelhöhe als nach dem Herzbeutel gleichzeitig geborsten war.

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass ein gesundes Herz unter den Verhältnissen des täglichen Lebens, auch bei grösster körperlicher Anstrengung, allen Widerständen, die im Kreislauf entstehen, gewachsen ist. Blaud (Bibl. méd. Tom. LXVIII) war der erste, der die Möglichkeit der Zerreißung gesunder Herzen bestritt. Man nahm also eine diffuse Erkrankung, meist Verfettung des Herzmuskels an. Auch Rokitsansky (1844) ist dieser Meinung, doch kommt er der heutigen Auffassung schon etwas näher, indem er schreibt: „So sehr man glauben sollte, dass vorzugsweise Herzen mit dünnen, erschlafften und sonst leicht zerreißlichen Wandungen zerreißen, oder dass die Zerreißung vorzugsweise dünnwandige Abschnitte des Herzens betrifft, so ist dies doch keineswegs der Fall, denn es zerreisst gerade vorzugsweise das Herz in seinem dicksten und kräftigsten Abschnitte, ja in den meisten Fällen findet sich dieser sogar in einem hypertrophischen Zustande.“ Weiter führt er an, dass dieser Abschnitt des Herzens oft in einer Weise erkrankt sei, die eine Disposition zur spontanen Zerreißung abgeben muss:

„Solche Erkrankungen sind die verschiedenen Fettsuchten des Herzens, vor allem aber jene, bei der das Herzfleisch mit Entfärbung zum Schmutziggelblichen, Fahlen, morsch und zerreißlich ist. Nebst diesen sind es Entzündungsherde im Herzfleisch,

und zwar die Entzündung in ihren ersten Stadien, die oft eine Zerreißung des Herzens veranlasst. Dann sind als eine entferntere Bedingung Verengung im arteriösen Ostium zu beachten.“

Am nächsten kommt dann die Auffassung Friedreichs (1867), der in seiner Abhandlung über die Krankheiten des Herzens sich über die zur Herzruptur disponirenden Momente folgendermassen äussert: „Namentlich sind hier die Fettkrankheiten des Herzens, die chronische und acute Myocarditis, die Abscesse und partiellen Aneurysmen des Herzens hervorzuheben. Auch Thrombosen der Coronararterien mit secundärer partieller, fettiger oder einfacher Erweichung der Muskelsubstanz hat man hie und da als Ursache gefunden, ebenso Geschwülste des Herzens, besonders wenn in deren Umgebung eine bedeutende secundäre Erkrankung des Muskelgewebes zustande gekommen war.“ Gegen die Ansicht, dass fettige Degeneration des Herzfleisches in der grössten Mehrzahl der Fälle die Ursache der Spontanruptur sei, wendet sich Steven (1885), indem er nachweist, dass gerade in Fällen von hochgradigster Fettdegeneration fast nie Herzruptur vorkommt. Dagegen ist er der Meinung, dass plötzlicher Verschluss von grösseren Aesten der Coronararterien zu hämorrhagischer Infarcirung und zu partieller Nekrose des Herzfleisches führt (cf. Tab. Fall 75, 76, 77).

Nach den neueren Forschungen ist man zu dem Resultat gekommen, dass spontane Herzruptur immer eine circumscripte Erkrankung im, resp. am Herzmuskel voraussetzt, bei sonst günstigen Bedingungen der übrigen Herzmusculatur. (Bei allgemeiner hochgradiger Entartung des Myocards und bei sehr schlaffer Mus-

culatur wird es wohl eher zur Herzlähmung kommen als zur Ruptur). Solche Prozesse sind alle die Gewebestörungen, die man als Myocarditis, fettige und parenchymatöse Muskeldegeneration bezeichnet, vor allem aber sind es die Formen der Nekrose des Herzmuskels, die nach Embolisirung oder Thrombosirung eines grösseren Astes der Coronararterie auftreten. Wenn man nach Cohnheim annimmt, dass die Aeste der Coronararterien Endarterien, so ist dies leicht verständlich, aber auch ohne dies würde bei völligem Verschluss eines Astes die Circulation schwer herzustellen sein, da die Erkrankung in der Regel über mehrere Aeste verbreitet ist. Gewöhnlich folgt der Nekrotisirung oder Entartung nicht gleich die Ruptur, nur bei ganz acuten grossen Erweichungen und wo noch eine excessive Körperanstrengung wie Heben schwerer Lasten, Pressen beim Stuhlgang, Tetanus, epileptischer Anfall u. s. w. hinzukommt, sondern es treten reparative Vorgänge auf, nämlich eine entzündliche Neubildung von Stützgewebe, sein Endresultat die Herzschiele. Da diese Partie bei der Contraktion des Herzmuskels sich nicht mit contrahiren kann, so bietet sie bei der Systole für das anprallende Blut einen Locus minoris resistentiae, gibt dem Drucke nach und buchtet sich zum Herzaneurysma aus, falls nicht schon vorher unter besonderen Umständen Ruptur erfolgt. Die Ausbuchtung der Herzwand führt zu deren Verdünnung, die endlich auch dem Drucke nicht mehr Stand hält und früher oder später rupturirt. Rupturen von Herzaneurysmen kommen verhältnissmässig häufiger vor; so erwähnt Monneret unter 19 Herzaneurysmen 3 Rupturen, Elléaume unter 55 Spontanrupturen 10 geborstene Aneurysmen.

Anschliessend an die allgemeine Aetiologie sei es mir gestattet, noch einige Bemerkungen über den Zusammenhang von Syphilis und Herzruptur zu machen. Durch zwei ganz verschiedene Processe kann die konstitutionelle Syphilis schliesslich zur Herzruptur führen. Einmal sind es die syphilitischen Gummata im Myocard, die dann erweichen und durchbrechen können; hierher gehörig ist Fall 37 der Tabelle. Den ersten derartigen Fall beschrieb Oppolzer. Der andereluetische Process, der am Herzen vorkommt, ist die spezifische Erkrankung der Kranzgefässe, die Endarteriitis syphilitica mit den gleichen Folgen wie die atheromatöse Veränderung der Coronararterien. So beschrieb Ehrlich das Herz eines durch Paralysis cordis zu Grunde gegangenen Syphilitikers und zeigte wie ein jeder Herd der vorhandenen multiplen Myocarditis in dem Gebiete eines undurchgängigen Kranzarterienastes lag (cf. Tabelle 50). Interessant sind die Fälle 113 und 116 (cf. Tab.), wo anscheinend beide Processe, Gummata und Endarteriitis, welch' letztere offenbar die Ursache zu den entstandenen Aneurysmen abgab, neben einander bestanden hatten. Ausser den Fällen in der Tabelle, wo ausdrücklich Syphilis vermerkt ist, glaube ich mit Recht bei der grössten Zahl jener Fälle, wo Herzruptur vor dem 50. Lebensjahre eintrat, jene Allgemeinerkrankung für die Localerkrankung am Herzen verantwortlich machen zu dürfen. Von den in Betracht kommenden Fällen wurde, als mit der Ruptur im Zusammenhang stehend, zweimal Aneurysma (F. 70, 85), zweimal Fettherz (F. 29, 63), achtmal atheromatöse Gefässveränderungen (F. 51, 62, 97, 99, 105, 123, 125, 126), einmal Erweichungsherd

(F. 41), einmal interstitielle Entzündung (F. 114) vermerkt. Besonders Arteriosklerose bei jüngeren Individuen rechtfertigt immer den Verdacht auf Lues. Eine genauere Anamnese, soweit sie überhaupt bei derartigen Fällen möglich ist, würde sicher den Procentsatz der Syphilis in Beziehung zur Herzruptur heben, oder gar späterhin die genauere Kenntniss des syphilitischen Virus dürfte diese Constitutionskrankheit als einen Hauptschuldigen dieser Herzerkrankung ansehen.

Bemerkenswert ist auch der Zusammenhang zwischen Herzruptur und Geisteskrankheit. Von den 8 in der Tabelle angeführten Fällen ist dreimal Arteriosklerose der Gehirnarterien resp. des ganzen Arteriensystems (39, 119, 131), viermal fettige Degeneration des Myocards (81, 82, 83, 119), zweimal sklerotische Veränderungen an den Klappen und Fettherz (111, 112) angegeben. Es liegt sehr nahe, beide Krankheitserscheinungen, die Geistesstörung und die Herzruptur in letzter Hinsicht auf denselben Process, auf die allgemeine Gefässerkrankung zurückzuführen.

Sehr oft erfolgt der Tod durch Herzruptur bei anscheinend ganz gesunden Leuten während völliger Ruhe, z. B. im Schlafe. In manchen Fällen wird die Katastrophe durch Gelegenheitsursachen beschleunigt und zwar durch Momente, die eine vermehrte Congestion nach dem Herzen verursachen; es gehören dahin stärkere Körperanstrengungen, wie Heben schwerer Lasten, Laufen, Husten, Erbrechen, Drängen beim Stuhlgang (Georg II., König von England starb dabei, Nicholls), Coitus (Morgagni erzählt einen solchen Fall bei einem Soldaten), Tissot erwähnt einen plötzlichen Tod durch Herzerreissung nach einem epileptischen

Anfälle (vergl. auch Tab. Fall 12); nach überstandnem Tetanus ist ein Fall (64) in der Tabelle mitgeteilt; auch heftige psychische Erregungen, wie Zorn, Freude, Schreck etc. (Philipp V. soll auf die Nachricht von der verlorenen Schlacht bei Piacenza plötzlich gestorben sein) werden öfters als Gelegenheitsursache aufgeführt.

Die Symptome bei spontaner Herzerreissung sind verschieden je nach der Constitution des Individuums selbst, seiner Sensibilität, je nach der Leistungsfähigkeit des übrigen Herzmuskels, je nach der Plötzlichkeit des Durchbruches und der Grösse der ausgetretenen Blutmenge; besonders kommt auch das Verhalten des Herzbeutels in Betracht. Ist der Herzmuskel an und für sich schwach und der Riss gross genug, so tritt der Tod meist ganz plötzlich, ohne jede Krampferscheinung, ein, dabei fühlen die Kranken oft den Moment der Zerreissung als einen plötzlichen Schmerz, als eine Sensation in der Herzgegend, als ob etwas berste, und finden noch Zeit, dies durch das Ausstossen eines Schreies kundzugeben, oder auch sie stürzen lautlos zusammen; bei noch kräftiger Musculatur treten meist Convulsionen, starke Atemnot und andere Anzeichen einer inneren Verblutung auf.

Erfolgt die Ruptur bei einem schwachen Muskel nur allmählig, so haben wir gewöhnlich das Bild der schwersten Angina pectoris vor uns: hochgradige Atemnot bei kleinstem, oft sehr langsamem Pulse, Schmerz in beiden Armen, namentlich dem linken und über dem Sternum, Uebelkeit, Erbrechen, kalter Schweiss, Benommenheit, leichte oder schwerere Convulsionen, Cheyne-Stockes'sches Atmen.

Auf ein Symptom bei langsam sich entwickelndem

Bluterguss in den Herzbeutel macht Naismith aufmerksam, nämlich einen heftigen, meist nur im Epigastrium lokalisirten Leibschmerz, vor dem alle anderen Erscheinungen in den Hintergrund treten (cf. Tab. F. 12, 17, 26, 42, 89, 101). Mitunter überleben die Kranken die Ruptur noch kürzere oder längere Zeit, was nur bei engem und gewundenem Risskanal möglich scheint (wo eine Art Herztamponade eintreten kann), um dann in einem zweiten oder dritten Anfalle zu bleiben. Dasselbe kann eintreten, wenn der Riss nicht sofort die ganze Dicke der Herzwand betrifft oder wenn gegenüber der Rissstelle viscerales und parietales Blatt des Herzbeutels obliterirt sind. Die Patienten erholen sich in vielen Fällen dann scheinbar nach den ersten Symptomen, um $\frac{1}{2}$ bis einige Tage später erst zu erliegen. Das plötzliche Eintreten des Todes hat man verschiedentlich zu erklären gesucht. Nach Rokitansky tritt der Tod ein durch Verblutung oder durch das Extravasat, oder in Folge der Trennung zahlreicher Muskelfasern durch selbstbeeinträchtigte Function des Herzens. Nach Bouillaud erfolgt der Tod durch Synkope als Folge der durch das Extravasat gesetzten plötzlichen Entziehung des Blutes d. i. Anaemie des Gehirns. Auch heute ist dies noch ein strittiger Punkt.

Ich glaube am meisten der Ansicht beipflichten zu dürfen, wonach angenommen wird, dass durch die acut gesetzte Anaemie der Herzmusculatur, wie auch in zweiter Linie des Gehirns, die Ernährung der erregenden Centren so beeinträchtigt wird, dass Herzlähmung erfolgen muss. Der durch den Bluterguss in den Herzbeutel gesetzten mechanischen Behinderung der Herzthätigkeit, möchte ich nicht zu viel Gewicht

beilegen, indem ich darauf verweise, dass oft noch viel grössere pericarditische Exsudate die Funktion des Herzens verhältnismässig wenig beeinflussen.

Die Diagnose auf Herzruptur am noch Lebenden lässt sich nur dann mit einiger Sicherheit stellen, wenn eine rasch zunehmende Verbreiterung der Herzdämpfung und Abschwächung des Spitzenschlages neben den bekannten Symptomen einer inneren Verblutung nachweisbar sind (cf. Tab. F. 32 u. 53).

Das Hauptgewicht in meiner Arbeit habe ich auf die Zusammenstellung einer möglichst ausführlichen Tabelle gelegt und hoffe dadurch einen kleinen Beitrag zum besseren Verständnis der Aetiologie der Herzrupturen geliefert zu haben. Die mit * bezeichneten Fälle habe ich der Tabelle Georg Meyers entnommen.

Am Schlusse dieser Arbeit erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermed.-Rath Prof. Dr. Bollinger für die gütige Ueberlassung des Stoffes und die liebenswürdige Uebernahme des Referats, Herrn Privatdozent Dr. Dürk für freundlich ertheilte Ratschläge meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Literatur.

- Cannstatt, Jahresbericht 1854 — 1864.
Virchow Hirsch, Jahresbericht 1866 — 1891.
Schmidts Jahrbücher 1872 — 1897.
Centralblatt für Pathol. und path. Anatomie 1891—1895.
Centralblatt für klin. Med. 1886.
Centralblatt für innere Med. 1895. — 1896.
Eulenburg's Realencyclopädie X. 3. Auflage.
Rosenbach, Herzkrankheiten.
Virchow's Archiv 79. Bd. 1880 (Weigert).
„ „ 90. Bd. 1882 (Ziegler).
„ „ 89. Bd. (Huber).
Zeitschr. für klin. Med. I. Bd. 1880 (Ehrlich).
König, Lehrb. d. spez. Chir. II. Bd. 1889.
Hygieia XXVI. 1861 (Malmsten).
Ziegler, Spez. path. Anat. 1890.
Beiträge zur path. Anat. von Ziegler u. Nauwerk 1888 (Beck);
1887 (Neelsen).
Zeitschrift für Biologie XVI p. 253. 1880.
Deutsch. Archiv für klin. Med. Bd. 7; Bd. 43. (Meyer).
Orth, Spez. path. Anath. Bd. I.
Rokitansky. Handb. d. path. Anat. 1844.
v. Ziemssen, Spez. Path. Ther. Bd. VI. 1879.
Friedreich, Herzkrankheiten 1867.
Förster, Handb. d. spez. path. Anat. 1863.
Archiv der Heilkunde IV. 1863 (Böttger).
Wiener med. Wochenschrift X. Jg. 1860 Nr. 5 u. 7.
Deutsche med. Wochenschrift 1895.
Berliner klin. Wochenschrift 1872.
Inauguraldissertationen des pathol. Instituts München: Aschen-
brenner, Herzruptur; v. Buchka, Herzruptur; Géor-
giadés, Herzaneurysmen; Ziller, Herzaneurysmen.
-

